



ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ ๕๓๘๒

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง คำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว กรณีพบการระบาดโรคโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน (ไทย - ลาว)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้รับแจ้งข่าวจากองค์การอนามัยโลก
เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอ สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ ๑ (Circulating Vaccine-derived
Poliovirus type 1: cVDPV1) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายใหม่ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่
อำเภอหมอก (Mok District) แขวงเชียงขวาง (Xiengkhouang Province) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ และล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย
ในแขวงบอลิคำไซ (Bolikhamsay Province) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๘ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ ๑ (cVDPV1) จำนวน ๓ ราย ในแขวงสะหวันนะเขต
(Savannakhet Province) จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และความเสี่ยง
ต่อการกระจายไปยังประเทศใกล้เคียง จากการประเมินพื้นที่ที่การระบาดของโรค พบว่าแขวงบอลิคำไซ
แขวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุรี และแขวงคำม่วน ซึ่งติดกับจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย
เลย นครพนม และมุกดาหาร โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนไทย - ลาว และยังมีจุดผ่านแดน
บริเวณชายแดนหลายแห่งที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕
(บึงกาฬ - บอลิคำไซ) รวมถึงด่านพรมแดนจังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโปลิโออาจจะ
แพร่กระจายเข้ามาระบาดสู่ในประเทศไทยจากการเดินทางข้ามชายแดนเข้า - ออกของชาวลาว และชาวไทย
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกกำหนดการแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ภายใต้กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005) เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโปลิโอเข้ามาระบาดในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนสำคัญ
ที่บ่งชี้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้
เพื่อให้ผู้เดินทางมีความรู้ และสามารถป้องกันการติดเชื้อโปลิโอจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ
จึงขอส่งคำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน (ไทย - ลาว) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ทางเว็บไซต์ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/UkbVy> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ 4930
17 ก.ย. 2569
เวลา.....น.

พร้อมแจ้งกำหนด...

พร้อมแจ้งกำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ทางเว็บไซต์ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/arKUw> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน แจ้งสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการในสังกัดได้รับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน และผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาวโดยเน้นย้ำการป้องกันตนเอง การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด และการเฝ้าระวังอาการผิดปกติภายหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดิเรก ขำแบน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ - ๗

โทรสาร -



คำแนะนำ
สำหรับผู้จะเดินทาง



แผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค